

Проверим, имеет ли она фундаментальную систему решений.

Выполним элементарные преобразования над ее основной матрицей. Вначале вычтем из второй и третьей строк первую:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{-I} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Полученные две последние строки не пропорциональны, поэтому прибавив, например, к третьей строке одну вторую второй строки, нулевую строку мы не получим, то есть в ступенчатой системе будет три строки. Значит, ранг данной системы уравнений равен 3.

Получаем, что ранг системы равен числу переменных. Значит эта система имеет единственное нулевое решение. Базиса на множестве решений нет.

Рассмотрим систему с четырьмя переменными:

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 2x_3 = 0 \\ x_2 + x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 + 4x_3 = 0 \end{cases}.$$

Так как число строк системы меньше числа переменных, то условие

$$r < n$$

(ранг r системы меньше числа переменных n)

наверняка выполнится. Значит, фундаментальную систему решений построить можно.

Составим матрицу из коэффициентов системы и приведем ее к ступенчатому виду:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 4 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{-I} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{-2II} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Ранг системы равен 3 (потому что в ступенчатой системе три строки):

$$r = 3 < 4 = n.$$

Посчитаем размерность пространства решений:

$$n - r = 4 - 3 = 1.$$

Значит, базис множества решений состоит из одного вектора.

Перейдем к системе:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \leftrightarrow \begin{cases} x_1 - 2x_2 + 2x_3 = 0 \\ x_2 + x_3 - x_4 = 0 \\ 2x_4 = 0 \end{cases}$$

Главные переменные – это x_1, x_2, x_4 (они соответствуют ведущим элементам матрицы). Переменная x_3 – свободная.

Выражаем главные переменные через свободную:

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 2x_3 = 0 \\ x_2 + x_3 - x_4 = 0 \\ 2x_4 = 0 \end{cases} \sim \begin{cases} x_1 = -4x_3 \\ x_2 = -x_3 \\ x_4 = 0 \end{cases}.$$

Чтобы найти один базисный вектор, надо взять любое ненулевое решение.

Для этого придадим переменной x_3 какое-то значение, например, 1:

$$\begin{array}{ccc|c} x_1 & x_2 & x_4 & x_3 \\ \hline & & & 1 \end{array}$$

Далее вычисляем значения главных переменных. Так как $x_3 = 1$, то из системы

$$\begin{cases} x_1 = -4x_3 \\ x_2 = -x_3 \\ x_4 = 0 \end{cases}$$

находим:

$$\begin{array}{ccc|c} x_1 & x_2 & x_4 & x_3 \\ \hline -4 & -1 & 0 & 1 \end{array}$$

Получаем базисный вектор–решение: $(-4, -1, 1, 0)$.

Найденный вектор будет составлять фундаментальную систему решений для данной системы уравнений. Значит, любое решение однородной системы можно выразить через этот базисный вектор. То есть, все векторы из множества M решений данной СЛУ пропорциональны этому вектору:

$$M = \{k(-4, -1, 1, 0) \mid k \in \mathbb{R}\} = \{(-4k, -k, k, 0) \mid k \in \mathbb{R}\}.$$

Теперь возьмем следующую систему:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 - 3x_4 = 0 \\ 3x_1 + 5x_2 + 6x_3 - 4x_4 = 0 \\ 4x_1 + 5x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ 3x_1 + 8x_2 + 24x_3 - 19x_4 = 0 \end{cases}.$$

Составляем основную матрицу и элементарными преобразованиями приводим ее к ступенчатому виду:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & -3 \\ 3 & 5 & 6 & -4 \\ 4 & 5 & -2 & 3 \\ 3 & 8 & 24 & -19 \end{pmatrix} \begin{array}{l} -3I \\ -4I \\ -3I \end{array} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & -3 \\ 0 & -1 & -6 & 5 \\ 0 & -3 & -18 & 15 \\ 0 & 2 & 12 & -10 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \cdot (-1) \\ -3II \\ +2II \end{array} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & -3 \\ 0 & 1 & 6 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Чтобы было меньше отрицательных чисел, после первого преобразования вторую строку мы умножили на (-1) .

Итак, имеем две нулевые строки, которые вычеркиваем:

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & -3 \\ 0 & 1 & 6 & -5 \end{pmatrix}.$$

Ступенчатая матрица построена, в ней две строки. Значит, ранг системы равен 2 и в системе 4 переменные

$$r = 2 < 4 = n.$$

Число векторов в базисе решений равно 2:

$$n - r = 4 - 2 = 2.$$

Найдем их.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & -3 \\ 0 & 1 & 6 & -5 \end{pmatrix} \leftrightarrow \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 - 3x_4 = 0 \\ x_2 + 6x_3 - 5x_4 = 0 \end{cases}.$$

Выражаем главные переменные x_1, x_2 через свободные x_3, x_4 :

$$\begin{cases} x_1 = 8x_3 - 7x_4 \\ x_2 = -6x_3 + 5x_4 \end{cases}.$$

Теперь нужно подставить вместо x_3, x_4 такие значения, чтобы получить два линейно независимых решения. Для этого снова составим таблицу:

x_1	x_2	x_3	x_4

Заполним столбцы x_3, x_4 числами так, чтобы получилась ступенчатая матрица. Часто выбирают самый простой вариант – записывают единичные строки, в которых на одной позиции стоит единица, а в остальных нули. Для нашего примера это строки: $(1,0)$ и $(0,1)$:

x_1	x_2	x_3	x_4
		1	0
		0	1

Теперь для каждого набора x_3, x_4 вычисляем значения главных переменных x_1, x_2 .

Из системы

$$\begin{cases} x_1 = 8x_3 - 7x_4 \\ x_2 = -6x_3 + 5x_4 \end{cases}$$

получим

x_1	x_2	x_3	x_4
8	-6	1	0
-7	5	0	1

Найдены два линейно независимых вектора-решения с координатами $(8, -6, 1, 0)$ и $(-7, 5, 0, 1)$.

Выше было получено, что пространство всех решений двумерно. Любая система из двух линейно независимых векторов в двумерном

пространстве будет базисом. Значит, базис на множестве решений данной однородной системы найден, то есть фундаментальная система решений построена.

Заметим, что в качестве базиса можно получить другие векторы, если взять другие значения свободных переменных.

Общее решение исходной системы может быть записано как линейная комбинация базисных векторов. Значит, множество M всех решений можно записать в виде четверки чисел, зависящей от произвольных значений k и s свободных переменных:

$$\begin{aligned} M &= \{k(8, -6, 1, 0) + s(-7, 5, 0, 1) \mid k, s \in \mathbb{R}\} = \\ &= \{(8k - 7s, -6k + 5s, k, s) \mid k, s \in \mathbb{R}\}. \end{aligned}$$